

CORSO DI GEOMETRIA E ALGEBRA	17 febbraio 2011
Cognome e Nome:	Matricola:
Corso di Laurea:	Anno di corso:

1. Si consideri l'applicazione lineare $L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che

$$L \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad L \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad L \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Determinare $L \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$:

(b) Determinare la matrice rappresentativa di L nelle basi standard di \mathbb{R}^3 :

(c) Determinare l'equazione/i cartesiana/e di $\text{Im } L$:

(d) Determinare una base di $\text{Ker } L$:

(e) Descrivere in forma parametrica l'insieme $\left\{ X \in \mathbb{R}^3 \mid L(X) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$:

2. Si considerino la seguente matrice quadrata di ordine 3 dipendente dal parametro reale h ed il vettore $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$:

$$A = \begin{pmatrix} h & -1 & h \\ 2h & -2 & 2 \\ 3 & -3h & 3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Determinare:

- (a) Per quali valori di h la matrice A è invertibile;
- (b) Il rango della matrice A in funzione del parametro reale h ;
- (c) Per quali valori di h il sistema omogeneo $AX = \mathbf{0}$ ha soluzioni non banali;
- (d) Per quali valori di h il vettore \mathbf{u} è una soluzione del sistema omogeneo $AX = \mathbf{0}$:

3. Fissato nello spazio un sistema di riferimento cartesiano ortogonale $\mathcal{R}(O, \hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}})$, si consideri la retta r di equazioni: $x + y + z = x - z - 2 = 0$. Determinare:
- La direzione della retta r :
 - Le equazioni cartesiane della retta s parallela a r e passante per il punto $A = (1, 1, 0)$:
 - L'equazione cartesiana del piano π contenente le rette r e s :
 - La distanza tra le rette r e s :
-

4. Si consideri la seguente matrice reale quadrata di ordine 4, in funzione del parametro reale k :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & k-1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Determinare:

- Gli autovalori della matrice A , con le corrispondenti molteplicità algebriche:
 - La molteplicità geometrica di ogni autovalore in funzione del parametro k :
 - Per quali valori di k la matrice è diagonalizzabile, giustificando la risposta.
-

5. Si consideri la forma quadratica

$$q(x, y) = 2x^2 - y^2 + 4xy$$

- Determinare il segno della forma quadratica:
- Scrivere la forma canonica $q(x', y') =$:
- Determinare la matrice M invertibile 2×2 tale che $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$:
- Determinare per quali valori del parametro k la forma quadratica

$$q(x, y) + k(x^2 + y^2)$$

è definita positiva:

CORSO DI GEOMETRIA E ALGEBRA	
	17 febbraio 2011
Cognome e Nome:	Matricola:
Corso di Laurea:	Anno di corso:

Svolgere in modo completo il seguente esercizio.

Sia $A \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(2)$ una matrice quadrata reale di ordine 2 che soddisfa le seguenti condizioni:

$$\det A = 2 \quad \text{tr}(A) = 3.$$

1. Determinare gli autovalori di A .
2. Stabilire se A è diagonalizzabile.
3. Determinare **tutte** le matrici A **reali simmetriche** che soddisfano le condizioni precedenti ed inoltre hanno un autospazio di equazione:

$$x + y = 0.$$